Creative Enzymes®

# lupanin 17-Hydroxylase (Cytochrom c)

*Cat. No. EXWM-1086*

*Lot. No.* (See product label)

## Einleitung

| | |
|---|---|
| **Beschreibung** | Das aus Pseudomonas putida isolierte Enzym enthält Häm c und benötigt Pyrrolochinolin-Quinon (PQQ) für die Aktivität. |
| **Synonyme** | Lupanin-Dehydrogenase (Cytochrom c) |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Form** | Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver |
| **EC-Nummer** | EC 1.17.2.2 |
| **Reaktion** | lupanin + 2 Ferricytochrom c + H2O = 17-Hydroxylupanin + 2 Ferrocytochrom c + 2 H+ |
| **Hinweise** | Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren. |

## Lager- und Versandinformation

| | |
|---|---|
| **Lagerung** | Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃. |