Creative Enzymes®

agaritine γ-Glutamyltransferase

Cat. No. EXWM-2309

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	4-Hydroxyanilin, Cyclohexylamin, 1-Naphthylhydrazin und ähnliche Verbindungen können als Akzeptoren wirken; das Enzym katalysiert auch die Hydrolyse von Agaritin.
Synonyme	(γ-L-Glutamyl)-N1-(4-Hydroxymethylphenyl)hydrazin: (Akzeptor) γ-Glutamyltransferase; (γ-L-Glutamyl)-1-N-(4-Hydroxymethylphenyl)hydrazin: (Akzeptor) γ-Glutamyltransferase; (γ-L-Glutamyl)-1-N-(4-Hydroxymethylphenyl)hydrazin: Akzeptor γ-Glutamyltransferase

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 2.3.2.9
CAS-Nummer	37257-25-3
Reaktion	agaritine + acceptor = 4-Hydroxymethylphenylhydrazin + γ-L-Glutamyl-Akzeptor
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.