

Cytokinin 7- β -Glucosyltransferase

Cat. No. EXWM-2344

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Wirkt auf eine Reihe von N6-substituierten Adeninen, einschließlich Zeatin und N6-Benzylaminopurin, jedoch nicht auf N6-Benzyladenin. Bei einigen Akzeptoren werden auch 9- β -D-Glucoside gebildet.

Synonyme

uridin-diphosphoglucose-zeatin 7-glucosyltransferase; cytokinin 7-glucosyltransferase; UDP-Glucose:zeatin 7-glucosyltransferase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.4.1.118

CAS-Nummer

72103-03-8

Reaktion

UDP-Glucose + ein N6-Alkylaminopurin = UDP + ein N6-Alkylaminopurin-7- β -D-Glucosid

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.