Creative Enzymes®

Hexokinase

Cat. No. EXWM-2945

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	D-Glukose, D-Mannose, D-Fruktose, Sorbitol und D-Glucosamin können als Akzeptoren wirken; ITP und dATP können als Donoren wirken. Das Leberisoenzym wurde manchmal als Glukokinase bezeichnet.
Synonyme	Hexokinase Typ IV Glukokinase; Hexokinase D; Hexokinase Typ IV; Hexokinase (phosphorylierend); ATP-abhängige Hexokinase; Glukose ATP Phosphotransferase

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 2.7.1.1
CAS-Nummer	9001-51-8
Reaktion	ATP + D-Hexose = ADP + D-Hexose 6-Phosphat
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.