Creative Enzymes®

Protein-Nπ-Phosphohistidin-Maltose-Phosphotransferase

Cat. No. EXWM-3043

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Dieses Enzym ist ein Bestandteil (bekannt als Enzym II) eines phosphoenolpyruvat (PEP)-abhängigen, zuckertransportierenden Phosphotransferasesystems (PTS). Das System, das nur in Prokaryoten vorkommt, transportiert gleichzeitig sein Substrat aus dem Periplasma oder dem extrazellulären Raum in das Zytoplasma und phosphoryliert es. Der Phosphatdonor, der zwischen den verschiedenen Systemen geteilt wird, ist ein phospho-tragendes Protein mit niedriger Molekülmasse, das von EC 2.7.3.9 (Phosphoenolpyruvat-Protein-Phosphotransferase) phosphoryliert wurde. Enzym II hingegen ist spezifisch für ein bestimmtes Substrat, obwohl in einigen Fällen alternative Substrate mit geringerer Effizienz transportiert werden können. Die Reaktion umfasst einen sukzessiven Transfer der Phosphatgruppe auf mehrere Aminosäuren innerhalb des Enzyms, bevor der endgültige Transfer zum Substrat erfolgt.
Synonyme	malT (Genname); Maltose PTS-Permease; EIIMal; Enzym IIMal

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 2.7.1.208
Reaktion	[protein]-Nπ-phospho-L-histidin + Maltose[side 1] = [protein]-L-histidin + Maltose 6'-phosphat[side 2]
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.