

nicht-spezifische Protein-Tyrosinkinase

Cat. No. EXWM-3127

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Im Gegensatz zu EC 2.7.10.1, Rezeptor-Protein-Tyrosinkinase, hat diese Protein-Tyrosinkinase keine transmembranäre Domäne. Im menschlichen Genom wurden 32 unspezifische Protein-Tyrosinkinasen identifiziert, die in zehn Familien unterteilt werden können.

Synonyme

ABL; ABL1; ABL2; ABLL; ACK1; ACK2; AGMX1; ARG; ATK; ATP: Protein-Tyrosin O-Phosphotransferase (mehrdeutig); BLK; Bmk; BMX; BRK; Brutons Tyrosinkinase; Bsk; BTK; BTKL; CAKb; Cdgip; CHK; CSK; CTK; CYL; zytoplasmatische Protein-Tyrosinkinase; EMT; ETK; Fadk; FAK; FAK2; FER; Fert1/2; FES; FGR; fokale Adhäsionskinase; FPS; FRK; FYN; HCK; HCTK; HYL; IMD1; ITK; IYK; JAK1; JAK2; JAK3; Januskinase 1; Januskinase 2; Januskinase 3; JTK1; JTK9; L-JAK; LCK; LSK; LYN; MATK; Ntk; p60c-src Protein-Tyrosinkinase; PKB; Protein-Tyrosinkinase (mehrdeutig); PSCTK; PSCTK1; PSCTK2; PSCTK4; PSCTK5; PTK2; PTK2B; PTK6; PYK2; RAFTK; RAK; Rlk; Sik; SLK; SRC; SRC2; SRK; SRM; SRMS; STD; SYK; SYN; Tck; TEC; TNK1; Tsk; TXK; TYK2; TYK3; YES1; YK2; ZAP70

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.7.10.2

Reaktion

ATP + a [protein]-L-Tyrosin = ADP + a [protein]-L-Tyrosinphosphat

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.