

UDP-N-Acetylglucosamin-lysosomales-Enzym N-Acetylglucosaminphosphotransferase

Cat. No. EXWM-3316

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Einige andere Glykoproteine mit hohem Mannosegehalt können als Akzeptoren fungieren, jedoch viel langsamer als lysosomale Enzyme.

Synonyme

N-Acetylglucosaminylphosphotransferase; UDP-N-Acetylglucosamin: lysosomales Enzym N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; UDP-GlcNAc: Glykoprotein N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; Uridin-Diphosphoacetylglucosamin-lysosomales Enzym Vorläufer Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; Uridin-Diphosphoacetylglucosamin-Glykoprotein Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; lysosomales Enzym Vorläufer Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; N-Acetylglucosaminyl Phosphotransferase; UDP-Acetylglucosamin: lysosomales Enzym N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; UDP-GlcNAc: lysosomales Enzym N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; UDP-N-Acetylglucosamin: Glykoprotein N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; UDP-N-Acetylglucosamin: Glykoprotein N-Acetylglucosaminyl-1-Phosphotransferase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.7.8.17

CAS-Nummer

84012-69-1

Reaktion

UDP-N-acetyl-D-glucosamin + lysosomales Enzym D-Mannose = UMP + lysosomales Enzym N-acetyl-D-glucosaminyl-phospho-D-mannose

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine Sonderanfertigung und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.