Creative Enzymes®

UDP-N-Acetylglucosamin-lysosomales-Enzym N-Acetylglucosaminphosphotransferase

Cat. No. EXWM-3316

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Einige andere Glykoproteine mit hohem Mannosegehalt können als Akzeptoren fungieren, jedoch viel langsamer als lysosomale Enzyme.
Synonyme	N-Acetylglucosaminylphosphotransferase; UDP-N-Acetylglucosamin: lysosomales Enzym N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; UDP-GlcNAc: Glykoprotein N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; Uridin-Diphosphoacetylglucosamin-lysosomales Enzym Vorläufer Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; Uridin-Diphosphoacetylglucosamin-Glykoprotein Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; lysosomales Enzym Vorläufer Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; N-Acetylglucosaminyl Phosphotransferase; UDP-Acetylglucosamin: lysosomales Enzym N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; UDP-GlcNAc: lysosomales Enzym N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; UDP-N-Acetylglucosamin: Glykoprotein N-Acetylglucosamin-1-Phosphotransferase; UDP-N-Acetylglucosamin: Glykoprotein N-Acetylglucosaminyl-1-Phosphotransferase

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 2.7.8.17
CAS-Nummer	84012-69-1
Reaktion	UDP-N-acetyl-D-glucosamin + lysosomales Enzym D-Mannose = UMP + lysosomales Enzym N-acetyl-D-glucosaminyl-phospho-D-mannose
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine Sonderanfertigung und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.