Creative Enzymes®

# β-D-Fucosidase

*Cat. No. EXWM-3900*

*Lot. No.* (See product label)

## Einleitung

| | |
|---|---|
| **Beschreibung** | Enzyme aus einigen Quellen hydrolysieren ebenfalls β-D-Galactoside und/oder β-D-Glucoside und/oder α-L-Arabinoside. Die Aktivität von EC 3.2.1.37 Xylan 1,4-β-Xylosidase ist eine assoziierte Aktivität, die in einigen Quellen (z.B. Leber) gefunden wird. |
| **Synonyme** | β-Fucosidase |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Form** | Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver |
| **EC-Nummer** | EC 3.2.1.38 |
| **CAS-Nummer** | 9025-34-7 |
| **Reaktion** | Hydrolyse von terminalen nicht-reduzierenden β-D-Fucose-Resten in β-D-Fucosiden |
| **Hinweise** | Dieser Artikel erfordert eine Sonderanfertigung und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren. |

## Lager- und Versandinformation

| | |
|---|---|
| **Lagerung** | Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃. |