

glucan 1,6- α -isomaltosidase

Cat. No. EXWM-3957

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Die optimale Aktivität liegt bei den 1,6- α -D-Glucanen, die 6, 7 und 8 Glucoseeinheiten enthalten; diejenigen, die 3, 4 und 5 Glucoseeinheiten enthalten, werden langsamer hydrolysiert.

Synonyme

exo-Isomaltohydrolase; Isomalto-Dextranase; Isomaltodextranase; G2-Dextranase; 1,6- α -D-Glucan Isomaltohydrolase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.2.1.94

CAS-Nummer

56467-68-6

Reaktion

Hydrolyse von (1 $\rightarrow$ 6)- α -D-glucosidischen Bindungen in Polysacchariden, um aufeinanderfolgende Isomaltoseeinheiten von den nicht reduzierenden Enden der Ketten zu entfernen

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.