Creative Enzymes®

DNA-3-Methyladenin-Glycosylase II

Cat. No. EXWM-3975

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Beteiligt an der Entfernung von alkylierte Basen aus DNA in Escherichia coli (vgl. EC 2.1.1.63 methylierte-DNA-[Protein]-Cystein S-Methyltransferase).
Synonyme	deoxyribonucleat 3-Methyladenin-Glycosidase II; 3-Methyladenin-DNA-Glykosylase II; DNA-3-Methyladenin-Glycosidase II; AlkA

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 3.2.2.21
CAS-Nummer	89287-38-7
Reaktion	Hydrolyse von alkylierter DNA, Freisetzung von 3-Methyladenin, 3-Methylguanin, 7-Methylguanin und 7-Methyladenin
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.