

Cytosol unspezifische Dipeptidase

Cat. No. EXWM-4032

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Ein Zinkenzym mit breiter Spezifität, die je nach Quellart etwas variiert. Aktiviert und stabilisiert durch Dithiothreitol und Mn^{2+} . Inhibiert durch Bestatin und Leucin.

Synonyme

N2- β -Alanylarginin-Dipeptidase; Glycyl-Glycin-Dipeptidase; Glycyl-Leucin-Dipeptidase; Iminodipeptidase; Peptidase A; Pro-X-Dipeptidase; Prolinase; Prolyl-Dipeptidase; Prolylglycin-Dipeptidase; Iminodipeptidase; Prolinase; L-Prolylglycin-Dipeptidase; Prolylglycin-Dipeptidase; Diglycinase; Gly-Leu-Hydrolase; Glycyl-L-Leucin-Dipeptidase; Glycyl-L-Leucin-Hydrolase; Glycyl-L-Leucin-Peptidase; L-Aminosäure-L-Aminosäure-Hydrolase; Glycylleucin-Peptidase; Glycylleucin-Hydrolase; Glycylleucin-Dipeptidase-Hydrolase; unspezifische Dipeptidase; menschliche zytosolische unspezifische Dipeptidase; Glycyl-L-Leucin-Hydrolase; Glycyl-Glycin-Dipeptidase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.4.13.18

CAS-Nummer

9025-31-4

Reaktion

Hydrolyse von Dipeptiden, vorzugsweise hydrophoben Dipeptiden einschließlich prolylhaltiger Aminosäuren

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.