Creative Enzymes®

Cytosol unspezifische Dipeptidase

Cat. No. EXWM-4032

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Ein Zinkenzym mit breiter Spezifität, die je nach Quellart etwas variiert. Aktiviert und stabilisiert durch Dithiothreitol und Mn2+. Inhibiert durch Bestatin und Leucin.
Synonyme	N2-β-Alanylarginin-Dipeptidase; Glycyl-Glycin-Dipeptidase; Glycyl-Leucin-Dipeptidase; Iminodipeptidase; Peptidase A; Pro-X-Dipeptidase; Prolinase; Prolyl-Dipeptidase; Prolylglycin-Dipeptidase; Iminodipeptidase; Prolinase; L-Prolylglycin-Dipeptidase; Prolylglycin-Dipeptidase; Diglycinase; Gly-Leu-Hydrolase; Glycyl-L-Leucin-Dipeptidase; Glycyl-L-Leucin-Hydrolase; Glycyl-L-Leucin-Peptidase; L-Aminosäure-L-Aminosäure-Hydrolase; Glycylleucin-Peptidase; Glycylleucin-Hydrolase; Glycylleucin-Dipeptidase-Hydrolase; unspezifische Dipeptidase; menschliche zytosolische unspezifische Dipeptidase; Glycyl-L-Leucin-Hydrolase; Glycyl-Glycin-Dipeptidase

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 3.4.13.18
CAS-Nummer	9025-31-4
Reaktion	Hydrolyse von Dipeptiden, vorzugsweise hydrophoben Dipeptiden einschließlich prolylhaltiger Aminosäuren
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.