

Koagulationsfaktor XIa

Cat. No. EXWM-4125

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

In der Peptidase-Familie S1 (Trypsin-Familie) und einem der γ -Carboxyglutaminsäure-haltigen Blutgerinnungsfaktoren. Das Proenzym Faktor XI wird durch Faktor XIIa aktiviert.

Synonyme

blutgerinnungsfaktor XIa; aktivierter blutgerinnungsfaktor XI; aktivierter plasma-thromboplastin-vorläufer

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.4.21.27

CAS-Nummer

37203-61-5

Reaktion

Selektive Spaltung der Arg \dagger Ala- und Arg \dagger Val-Bindungen in Faktor IX zur Bildung von Faktor IXa

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine Sonderanfertigung und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.