

Koagulationsfaktor XIIIa

Cat. No. EXWM-4132

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Aktiviert auch Plasminogen und Plasma-Prokallikrein. Gebildet aus dem Proenzym, Faktor XII, durch Plasma-Kallikrein oder Faktor XIIa. In der Peptidase-Familie S1 (Trypsin-Familie)

Synonyme

Hageman-Faktor (aktiviert); Blutgerinnungsfaktor XII_f; aktivierter β-Blutgerinnungsfaktor XII; Prealbumin-Aktivator; Hageman-Faktor β-Fragment; Hageman-Faktor-Fragment H_{Ff}; Blutgerinnungsfaktor XIIa_β; Prekallikrein-Aktivator; Kallikreinogen-Aktivator

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.4.21.38

CAS-Nummer

75216-42-1

Reaktion

Selektive Spaltung von Arg⁺Ile-Bindungen in Faktor VII zur Bildung von Faktor VIIa und Faktor XI zur Bildung von Faktor XIa

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C ~ -80 °C.