Creative Enzymes®

u-Plasminogen-Aktivator

Cat. No. EXWM-4165

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Gebildet aus dem inaktiven Vorläufer durch die Wirkung von Plasmin oder Plasma-Kallikrein. Unterscheidet sich in der Struktur vom t-Plasminogen-Aktivator (EC 3.4.21.68) und bindet nicht an Fibrin. In der Peptidase-Familie S1 (Trypsin-Familie). Früher in EC 3.4.21.31 und EC 3.4.99.26 enthalten.
Synonyme	urokinase; urinärer Plasminogen-Aktivator; zellulärer Plasminogen-Aktivator; Urokinase-Typ Plasminogen-Aktivator; doppelketten Urokinase-Typ Plasminogen-Aktivator; zwei-Ketten Urokinase-Typ Plasminogen-Aktivator; Urokinase Plasminogen-Aktivator; uPA; u-PA; Abbokinase; urinäre Esterase A

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 3.4.21.73
CAS-Nummer	9039-53-6
Reaktion	Spezifische Spaltung der Arg┼Val-Bindung in Plasminogen zur Bildung von Plasmin
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine individuelle Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen individuell produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.