

Limulus-Gerinnungsfaktor C

Cat. No. EXWM-4176

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Aus den Hämocyten-Granula der Scherenkrabben Limulus und Tachypleus. Faktor C wird durch gramnegative bakterielle Lipopolysaccharide und Chymotrypsin aktiviert. Hemmt durch Antithrombin III. In der Peptidase-Familie S1 (Trypsin-Familie).

Synonyme

Faktor C; Limulus-Faktor C

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.4.21.84

CAS-Nummer

115743-27-6

Reaktion

Selektive Spaltung der -Arg103↓Ser- und -Ile124↓Ile- Bindungen im Limulus-Gerinnungsfaktor B zur Bildung von Faktor B. Spaltung der -Pro-Arg↓ Bindungen in synthetischen Substraten.

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.