Creative Enzymes®

Limulus-Gerinnungsfaktor C

Cat. No. EXWM-4176

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Aus den Hämocyten-Granula der Scherenkrabben Limulus und Tachypleus. Faktor C wird durch gramnegative bakterielle Lipopolysaccharide und Chymotrypsin aktiviert. Hemmt durch Antithrombin III. In der Peptidase-Familie S1 (Trypsin-Familie).
Synonyme	Faktor C; Limulus-Faktor C

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 3.4.21.84
CAS-Nummer	115743-27-6
Reaktion	Selektive Spaltung der -Arg103┼Ser- und -Ile124┼Ile- Bindungen im Limulus-Gerinnungsfaktor B zur Bildung von Faktor B. Spaltung der -Pro-Arg┼ Bindungen in synthetischen Substraten.
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.