Creative Enzymes®

gastricsin

Cat. No. EXWM-4267

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Gebildet aus Progastricsin, anscheinend im Magensaft der meisten Wirbeltiere. Neben dem Fundus wird Progastricsin auch im Antrum und im proximalen Duodenum ausgeschüttet. Das Samenplasma enthält ein Zymogen, das immunologisch identisch mit Progastricsin ist. In der Peptidase-Familie A1 (Pepsin A-Familie).
Synonyme	pepsin C; Schweineparapepsin II; Parapepsin II

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 3.4.23.3
CAS-Nummer	9012-71-9
Reaktion	Mehr eingeschränkte Spezifität als Pepsin A, zeigt jedoch eine bevorzugte Spaltung an Tyr┼-Bindungen. Hohe Aktivität auf Hämoglobin.
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.