

Makrophagenelastase

Cat. No. EXWM-4348

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Dieses Enzym wird als Proenzym mit 53 kDa synthetisiert, das in eine aktive Form mit 22 kDa umgewandelt wird. cDNA-Sequenzen wurden für die Enzyme von Maus und Mensch erhalten. In der Peptidase-Familie M10 (Familie der interstitiellen Kollagenasen)

Synonyme

metalloelastase; humane Makrophagen-Metalloelastase (HME)

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.4.24.65

CAS-Nummer

9004-06-2

Reaktion

Hydrolyse von löslichem und unlöslichem Elastin. Spezifische Spaltungen treten auch bei -Ala14+Leu- und -Tyr16+Leu- in der B-Kette von Insulin auf.

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.