

fragilysin

Cat. No. EXWM-4358

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Gedacht als eine Ursache für Durchfall bei Tieren und Menschen. Hydrolysiert extrazelluläre Matrixproteine und stört die engen Verbindungen von intestinalen Epithelzellen. Zersetzt auch intrazelluläre, zytoskelettale Proteine wie Aktin, Myosin und andere. In der Peptidase-Familie M10 (Familie der interstitiellen Kollagenasen).

Synonyme

Bacteroides fragilis (entero)toxin

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.4.24.74

CAS-Nummer

188596-63-6

Reaktion

Breite proteolytische Spezifität, gespaltene Bindungen einschließlich -Gly†Leu-, -Met†Leu-, -Phe†Leu-, -Cys†Leu-, Leu†Gly

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.