Creative Enzymes®

Immobilisierte humane Urokinase

Cat. No. NATE-1759

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Immobilisierte menschliche Zwei-Ketten-HMW-Urokinase ist ideal für die kontrollierte Aktivierung von Plasminogen zu Plasmin. Nach Abschluss der Aktivierung wird das Harz einfach entfernt und die Reaktion gestoppt. Kann zur Immunreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern verwendet werden, die gegen menschliche Urokinase gerichtet sind. Kann wiederholt verwendet werden.
Synonyme	Urokinase; EC 3. 4. 21. 73; Urokinase-Typ Plasminogen-Aktivator; uPA; U-Plasminogen-Aktivator; Zellulärer Plasminogen-Aktivator; Urin-Plasminogen-Aktivator

Produktinformation

Art	Mensch
Herkunft	Insektenzellkultur
Form	Harz
EC-Nummer	EC 3. 4. 21. 73
Molekulargewicht	54000
Reinheit	>95% durch SDS-PAGE-Analyse
Konzentration	2. 0 mg/ml
Puffer	0,05M Natriumacetat; 0,1M NaCl; 1mM EDTA; 0,02% Natriumazid; pH 5,0
Konservierungsmittel	Natriumazid
Extinktionskoeffizient	1. 36

Lager- und Versandinformation

Lagerung	4°C
Stabilität	12 Monate ab Lieferung