Creative Enzymes®

Immobilisiertes TPCK-Trypsin auf F7m

Cat. No. NATE-1771

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Trypsin hydrolysiert Proteine, Peptide, Amide und Ester spezifisch an den Carboxylgruppen der basischen Aminosäuren L-Arginin oder L-Lysin. F7m: 1. 0 mg Trypsin pro CR-Säule, immobilisiert auf Polyvinyl 10.200 ST-Einheiten immobilisiert pro CR-Säule. Nr. 15 Lagerpuffer: 50 mM Tris/HCl bei pH 8.0 bei 4°C Nr. 67 Reaktionspuffer: 50 mM Phosphat bei pH 8.0 Nr. 68 Waschpuffer: 50 mM Phosphat bei pH 8.0, 1 M NaCl
Synonyme	α-Trypsin; β-Trypsin; Kokonase; Parenzyms; Parenzyml; Tryptar; Trypure; Pseudotrypsin; Tryptase; Tripcellim; Spermrezeptor-Hydrolase; Alpha-Trypsin; Beta-Trypsin; EC 3. 4. 21. 4; Trypsin

Produktinformation

Herkunft	Rinderpankreas
EC-Nummer	EC 3. 4. 21. 4

Lager- und Versandinformation

Lagerung	4 °C