

Immobilisiertes TPCK-Trypsin auf G3m

Cat. No. NATE-1772

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Trypsin hydrolysiert Proteine, Peptide, Amide und Ester spezifisch an den Carboxylgruppen der basischen Aminosäuren L-Arginin oder L-Lysin. G3m: 25 µg Trypsin pro CR-Säule, immobilisiert auf Dextran. 260 ST-Einheiten immobilisiert pro CR-Säule. Diese CR-Säule schneidet mindestens 50 µg Tubulin pro Anwendung. Nr. 15 Lagerpuffer: 50 mM Tris/HCl bei pH 8.0 Nr. 67 Reaktionspuffer: 50 mM Phosphat bei pH 8.0 (Sörensen) Nr. 68 Waschpuffer: 50 mM Phosphat bei pH 8.0, 1 M NaCl

Synonyme

α-Trypsin; β-Trypsin; Kokonase; Parenzyms; ParenzymI; Tryptar; Trypure; Pseudotrypsin; Tryptase; Tripcellim; Spermrezeptor-Hydrolase; Alpha-Trypsin; Beta-Trypsin; EC 3. 4. 21. 4; Trypsin

Produktinformation

Herkunft

Rinderpankreas

EC-Nummer

EC 3. 4. 21. 4

Lager- und Versandinformation

Lagerung

4 °C