

β-Acetylglucosaminidase 18A von *Bacteroides thetaiotaomicron*, rekombinant

Cat. No. NATE-1291

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

β-Acetylglucosaminidase 18A ist ein Enzym aus *Bacteroides thetaiotaomicron*, das an der Endohydrolyse der Diacetylchitobiosyl-Einheit in hochmannosehaltigen Glykoproteinen und Glycopeptiden beteiligt ist, die die (Man(GlcNAc)(2)Asn-Struktur enthalten. Ein N-Acetyl-D-Glucosamin-Rest bleibt an dem Protein gebunden; der Rest des Oligosaccharids wird intakt freigesetzt. Rekombinantes BtAcp18A (GH18), gereinigt aus *Escherichia coli*, ist eine Ein-Domänen-Familie 18 Glycosid-Hydrolase (GH18).

Synonyme

beta-N-Acetyl-D-Hexosaminidase; N-Acetylhexosaminohydrolase; β-N-Acetylhexosaminidase; N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase, β-N-Acetylglucosaminidase

Produktinformation

Art *Bacteroides thetaiotaomicron*

Herkunft *E. coli*

Form 35 mM NaHepes-Puffer, pH 7,5, 750 mM NaCl, 200 mM Imidazol, 3,5 mM CaCl₂, 0,02% Natriumazid und 25% (v/v) Glycerin.

EC-Nummer EC 3.2.1.96

CAS-Nummer 37278-88-9

Molekulargewicht 50.3 kDa

Reinheit >50% durch SDS-PAGE

Konzentration 1 mg/mL

Optimales pH 7.5

Optimale Temperatur 37 °C

Spezifität Mammalian high mannose N-Glykane (HMNG), wie Man₉GlcNAc₂

Lager- und Versandinformation

Lagerung Dieses Enzym wird bei Raumtemperatur versendet, sollte jedoch bei -20 °C gelagert werden.