

Xylosidase 43A von *Cellvibrio japonicus*, rekombinant

Cat. No. NATE-1528

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Setzt reduzierende Zucker aus Birkenholz-Xylan (X0502) frei, katalysiert auch die Hydrolyse von 4-Methylumbelliferyl- β -D-celllobiosid und 4-Methylumbelliferyl- β -D-glucopyranosid. Dieses Enzym besitzt keine Endo-Xylanase-, Arabinoxylanase- oder β -Glukanase-Aktivitäten. β -Xylosidase unterliegt einer posttranslationalen Glykosylierung, die sich als entscheidend für ihre ordnungsgemäße Aktivität und Stabilität erwiesen hat. Die Deglykosylierung veränderte die optimale Temperatur und den pH-Wert für die Aktivität und verringerte ihre Thermostabilität.

Synonyme

β -Xylosidase; EC 3.2.1.37; 9025-53-0; Xylosidase

Produktinformation

Art *Cellvibrio japonicus*

Herkunft *E. coli*

Form 35 mM NaHepes-Puffer, pH 7,5, 750 mM NaCl, 200 mM Imidazol, 3,5 mM CaCl₂, 0,02% Natriumazid und 25% (v/v) Glycerin

EC-Nummer EC 3.2.1.37

CAS-Nummer 9025-53-0

Molekulargewicht 39.9 kDa

Reinheit >90 % wie durch SDS-PAGE beurteilt

Konzentration 1 mg/mL

Optimales pH 7

Optimale Temperatur 25 °C

Spezifität Zuckerröhr-Arabinan in einer Exo-Form und 4-Nitrophenyl-L-Arabinofuranosid (4NPA)

Lager- und Versandinformation

Lagerung Dieses Enzym wird bei Raumtemperatur versendet, sollte jedoch bei -20 °C gelagert werden.