

# Native Clostridium histolyticum Kollagenase

Cat. No. DIGS-253

Lot. No. (See product label)

## Einleitung

### Beschreibung

Kollagenasen sind Endopeptidasen, die natives Kollagen im Bereich der triple Helix verdauen. Kollagene sind die Hauptbestandteile des faserigen tierischen extrazellulären Bindegewebes. Bakterielle Kollagenasen unterscheiden sich von Wirbeltierkollagenasen dadurch, dass sie eine breitere Substratspezifität aufweisen (Peterkofsky 1982, Birkedal-Hansen 1987). Im Gegensatz zu tierischen Kollagenasen, die Kollagen in seiner nativen triple-helikalen Konformation spalten (Woolley et al. 1975, Gross et al. 1974), ist bakterielle Kollagenase einzigartig, da sie sowohl wasserunlösliche native Kollagene als auch wasserlösliche denaturierte abbauen kann. Sie kann fast alle Kollagentypen angreifen und ist in der Lage, mehrere Spaltungen innerhalb der triple-helikalen Regionen vorzunehmen (Mookhtiar und Van Wart 1992).

### Anwendungen

Isolation von Adipozyten, Hepatozyten und Zellen aus Lunge, Epithel und Nebennierengewebe Isolation von Kardiomyozyten und Zellen aus Knochen, Knorpel, Muskel, Schilddrüse und Endothel Isolation von Brustdrüsen- und verschiedenen anderen Weichgeweben Isolation von menschlichen und porzinen Pankreasinseln (Kin 2007) Die Behandlung von Geweben mit hoher Kollagenase, mit ihrer Mischung aus proteolytischen Aktivitäten, ermöglicht eine sanfte, selektive Verdauung der interzellulären Matrix mit geringem Schaden an den Zellen oder Verlust der Lebensfähigkeit AFA-Kollagenase ist geeignet für Anwendungen, die die Einführung von tierischen Krankheitserregern in biotechnologische Verfahren vermeiden müssen

### Synonyme

EC 3.4.24.3; Kollagenase; Clostridiopeptidase A; Clostridium histolyticum Kollagenase; Kollagenase A; Kollagenase I; Achromobacter iophagus Kollagenase; Aspergillopeptidase C; Nucleolysin; Kollagenase, Typ 1; Kollagenase, Typ 2; Kollagenase, Typ 3; Kollagenase, Typ 4; Kollagenase, Typ 5

## Produktinformation

### Herkunft

Clostridium histolyticum

### Form

Lyophilisiertes Pulver

### EC-Nummer

EC 3.4.24.3

### CAS-Nummer

9001-12-1

### Molekulargewicht

68 to 130 kDa

### Aktivität

Typ 1 > 125 Einheiten pro mg; Typ 2 > 125 Einheiten pro mg; Typ 3 > 100 Einheiten pro mg; Typ 4 > 160 Einheiten pro mg; Typ 5 > 450 Einheiten pro mg

### Optimales pH

6.3-8.5

### Zusammensetzung

Clostridium-Kollagenasen stellen ungewöhnlich große Metalloproteasen dar, eine Familie von Proteasen, die ein zinkhaltiges Motiv im Zentrum der aktiven Stelle teilen (Gonzales und Robert-Baudouy 1996).

### Aktivatoren

Ca<sup>2+</sup> Zn<sup>2+</sup>

### Hemmer

EDTA EGTA Cystein Histidin DTT 2-Mercaptoethanol o-Phenanthroline Hg<sup>2+</sup> Pb<sup>2+</sup>

**Einheitsdefinition**

Eine Einheit setzt in 5 Stunden bei 37°C, pH 7,5 ein Mikromol L-Leucin-Äquivalente aus Kollagen frei.

**Lager- und Versandinformation****Stabilität**

Dieses Produkt ist bei einer Lagerung von -20°C mindestens ein Jahr stabil. Es gibt keinen Verlust an FALGPA oder Proteaseaktivität innerhalb von 30 Tagen bei 37°C, 50°C und -20°C.